

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

12

21 Numéro de dépôt : 94402226.8

22 Date de dépôt : 05.10.94

51 Int. Cl.⁵ : B01F 17/00, B01F 17/28

30 Priorité : 12.10.93 US 135094

43 Date de publication de la demande :
12.04.95 Bulletin 95/15

54 Etats contractants désignés :
AT BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LJ LU NL
PT SE

71 Demandeur : RHONE-POULENC SPECIALTY
CHEMICALS CO.
Prospect Plains Road,
CN 7500
Cranbury, NJ 08512-7500 (US)

72 Inventeur : Desai, Bharat
7 Matthew Road
Bel Mead, New Jersey 08502 (US)
Inventeur : Lees, Peter
30 Kingsley Crescent
Birkenshaw, Bradford (GB)
Inventeur : Ricca, Jean-Marc
41, Avenue Leclerc
F-69007 Lyon (FR)
Inventeur : Tracy, David J.
37-03 Ravens Crest Drive
Plainsboro, New Jersey 08536 (US)

74 Mandataire : Fabre, Madeleine-France
RHONE-POULENC CHIMIE,
Direction de la Propriété Industrielle,
25 Quai Paul Doumer
F-92408 Courbevoie Cédex (FR)

54 Amphocétates tensio-actifs de plus grande pureté, dérivés de l'imidazoline, et leurs procédés de préparation.

57 Amphocétates tensio-actifs de plus grande pureté, dérivés de l'imidazoline et contenant des quantités quasiment négligeables d'amido amines non alcoylées, de faibles quantités de sels de l'acide glycolique et de sels de monochloroacétate.
Ils peuvent être obtenus par réaction d'une alkylimidazoline avec un acide monochloroacétique en présence d'un alcali à un pH ne dépassant pas 10.
Ils possèdent des propriétés tensio-actives et de douceur améliorées.


La présente invention concerne des amphotécates tensio-actifs de plus grande pureté, dérivés de l'imidazoline, caractérisés par une amélioration de la régularité de leur composition, de la douceur et de l'activité de surface et par une amélioration de leurs procédés de préparation.

Les amphotécates tensio-actifs, dérivés de l'imidazoline sont utilisés sur une grande échelle comme base tensio-active dans les formulations cosmétiques tels que shampoings, produits de nettoyage détergents et autres en raison de leur douceur, de la sécurité qu'ils offrent et de l'absence de tout effet irritant sur la peau et les yeux.

Les amphotécates tensio-actifs, dérivés des imidazolines, constituent une famille de tensio-actifs caractérisée par la présence de motifs transitoires à charges positives et négatives. Selon le pH du milieu, ils peuvent, par conséquent, agir comme tensio-actifs anioniques, cationiques ou non-ioniques. Les amphotécates tensio-actifs présentent d'excellentes propriétés tensioactives telles que réduction de la tension de surface, faibles valeurs pc-20 (efficacité tensio-active / quantité de tensio-actif nécessaire pour abaisser l'activité de surface de 20 unités), excellent pouvoir moussant, mouillant et autres. Ils sont compatibles à la fois avec les tensio-actifs cationiques et les tensio-actifs anioniques. En raison de leur biodégradabilité, de l'absence d'irritation de la peau et de leur aptitude incomparable à réduire le pouvoir irritant de tensio-actifs plus agressifs, tels que les éther sulfates, les amphotécates tensio-actifs sont utilisés de plus en plus comme tensio-actifs secondaires dans l'industrie de l'hygiène corporelle. Par ailleurs, en raison de leur résistance à l'hydrolyse, de leur compatibilité avec les électrolytes et de leur excellente hydrotropie, ils peuvent être employés aussi dans les formulations de produits de nettoyage à usages domestiques et industriels.

Il existe plusieurs types différents de tensio-actifs amphotères, dérivés de l'imidazoline, par exemple, les propionates, les sulfonates et les acétates. Ils sont obtenus en faisant réagir un dérivé approprié de l'imidazoline sur un agent approprié contenant le groupe fonctionnel voulu. Par exemple, les amphotécates peuvent être obtenus de la façon suivante:

1) on forme une imidazoline substituée en faisant réagir une aminoéthyl alcool amine ou une éthylène alkylène triamine sur un acide gras




FORMULE I

2) on hydrolyse l'imidazoline en une amido amine et l'on fait réagir ensuite (ou simultanément) lesdits composés sur un agent d'alkylation, tel que l'acide monohalogénoacétique ou son sel de sodium en présence d'hydroxyde de sodium.


On a pensé que les tensio-actifs amphotères, dérivés de l'imidazoline, peuvent contenir un mélange de différentes familles de tensio-actifs. Les structures suivantes ont été citées dans la littérature:

AMPHOMONOACETATE

Formule II




Formule III




AMPHODIACETATE


Formule IV




Formule V



Formule VI



Formule VII



(Ancienne structure proposée)

Dans ces formules, R représente des groupes coco ou d'autres groupes alkyle appropriés.

Le dictionnaire "Cosmetic Toiletary and Fragrance Association International Cosmetic Ingredients Dictionary" décrit les amphotérates et les amphodiacétates comme étant deux familles distinctes de tensio-actifs amphotères dérivés de l'imidazoline. Ces derniers sont obtenus en faisant réagir une imidazoline dans des conditions d'alcoylation (carboxylation) avec soit un équivalent (ou léger excès) soit deux équivalents (ou un excès) d'un agent alcoylant approprié, par exemple, du monochloroacétate de sodium. Les alkyles correspondants peuvent être des chaînes coco, lauryle (coco ou lauryl amphotérates ou diacétates) ou choisis parmi d'autres acides gras suivant l'application recherchée. De plus, étant donné que l'imidazoline de départ est asymétrique par nature, les deux types de dérivés peuvent être obtenus à partir de l'une ou de l'autre des amines possibles dérivant des imidazolines. C'est la raison pour laquelle les deux types de structures "amine primaire/amide tertiaire" et "amine secondaire/amide primaire" sont mentionnés dans la littérature.

L'agent d'alcoylation, le monochloroacétate de sodium, utilisé couramment pour préparer les amphotérates et les diacétates, est un réactif chimique qui, dans des conditions de réaction, peut subir un certain nombre de différents types de réactions:

1. Réaction avec les fonctions amino de l'imidazoline ou des imidazolines hydrolysées pour donner des espèces mono ou polycarboxylées.
2. Réaction avec l'eau pour donner les dérivés correspondants de l'acide glycolique ou réaction avec l'acide glycolique pour obtenir des diglycolates.
3. Réaction avec les groupes hydroxyéthyles du dérivé de l'imidazoline pour obtenir les carboxyméthyl éthers correspondants.

Parmi les réactions possibles indiquées ci-dessus, seules "1" et "3" sont susceptibles de conduire à la formation des espèces amphotères recherchées alors que les réactions du type 2 donnent des sous-produits indésirables (glycolates/diglycolates), réduisant ainsi la quantité d'agent d'alcoylation disponible pour la réaction.

Récemment, après la mise au point d'une nouvelle méthode d'analyse, on a constaté que les coco/lauryl amphotérates du commerce contiennent (en plus du chlorure de sodium) les principaux composants organiques suivants:

Amphoacétate (dérivé de l'amine secondaire/amide primaire, Formule II)

Amido amine non alcoylée correspondante

Glycolate/diglycolate 0.08-0.16 mg g⁻¹ FW acid-soluble

Monochloroacétate de sodium résiduel

Les résultats ci-dessus reposent sur l'utilisation de la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire (^1H , ^{13}C) et de l'électrophorèse capillaire.

Les résultats ci-dessus reposent sur l'utilisation de la chromatographie en phases liquide et gazeuse et de l'électrophorèse capillaire.

Le tableau suivant donne les résultats obtenus à la suite de l'analyse de trois amphoacetates

10		rapport		acide glycolique %
		amphoacétate	/ amidoamine non alcoylée	
15	Produit du commerce I	75	/ 25	2,6
	Produit du commerce II	63	/ 37	2,4
	Produit du commerce III	83	/ 17	2,0

20 Les résultats ci-dessus montrent que les produits du commerce contiennent tous une quantité significative de produit non alcoylé. Le présence de produit non alcoylé exerce une action négative sur l'activité de surface. L'excès de monochloroacétate de sodium conduit aussi à la formation d'un sous-produit, l'acide glycolique. Le sous-produit est indésirable, car l'acide glycolique ne contribue en rien aux propriétés tensio-actives du composé recherché.

sous la forme de glycolate de sodium. Ce sel est soluble dans l'eau et ne présente rien aux propriétés tensio-actives du composé recherché.

Le brevet US n° 4 269 730 enseigne un procédé de préparation de tensioactifs amphiphiles de plus grande pureté dans lequel on chauffe à une température comprise entre 70 et 80°C un mélange constitué d'imidazole dans lequel on chauffe à une température comprise entre 20 et 50 °C, jusqu'à ce que le chlorure de sodium soit consommé pour l'essentiel, on ajoute ensuite de 1,0 à 2,5 équivalents molaires de NaOH sur la base du sel de chloroacétate et on chauffe à une température allant de 70 à 80°C, au moins jusqu'à ce que tous les cycles imidazole soient ouverts et forment une solution aqueuse limpide contenant de 15 à 35 % tous les cycles imidazole. Contrairement aux enseignements de ce document, on a trouvé que le produit selon ce brevet contient toujours des quantités de sous-produits qui affectent l'activité de surface du produit final.

Cependant, les conditions de la réaction, on peut obtenir des émulsifiants très actifs et on peut en outre obtenir des produits de haute pureté.


[illegible]

Selon l'invention, on met à disposition des alcoylations et présentent une meilleure activité de surface. Les produits ainsi obtenus sont caractérisés par une plus grande pureté et sont plus faciles à utiliser. Ils sont également caractérisés par une plus grande stabilité et présentent une meilleure activité de surface. Selon l'invention, on met à disposition des alcoylations et présentent une meilleure activité de surface. Les produits ainsi obtenus sont caractérisés par une plus grande pureté et sont plus faciles à utiliser. Ils sont également caractérisés par une plus grande stabilité et présentent une meilleure activité de surface.

d'acétate. Le procédé selon l'invention permet de mettre en oeuvre des rapports molaires plus faibles entre l'imidazoline substituée ou son dérivé et les sels d'halogénoacétate, soit inférieurs à 1 : 1,5 et voisins de 1 : 1, alors que l'on obtient toujours un produit qui, pour l'essentiel, est entièrement alcylé.

Le contrôle soigneux du pH et de la température pendant la durée de la réaction permet à la réaction de se dérouler avec une quantité moindre de sel de monohalogénoacétate de sodium et d'obtenir ainsi un produit de plus grande pureté (moins de sous-produits amide non alcylée, acide glycolique, NaCl et sel d'halogénoacétate résiduel). Les produits selon l'invention, outre qu'ils sont économiquement plus intéressants que les produits obtenus par purification des produits préparés selon le procédé de l'état de la technique, présentent des propriétés tensio-actives supérieures et une plus grande flexibilité dans les formulations.

Les imidazolines de départ, mises en oeuvre dans le procédé de l'invention peuvent être représentées par la formule suivante:



FORMULE I

dans laquelle R est un radical aliphatique contenant de 5 à 19 atomes de carbone par molécule, X représente OH ou NH_2 , et n est un nombre entier de 2 à 4. R est, de préférence un radical aliphatique contenant en majorité de 8 à 18 atomes de carbone environ par molécule, X représentant OH et n étant égal à 2.

En raison de la chimie en question, les composés selon la formule ci-dessus contiennent généralement des mélanges de différents radicaux R dans les fourchettes définies plus haut. Dans l'un des modes de réalisation préférentiels de l'invention, R est un mélange de radicaux aliphatiques saturés et insaturés, dérivés de l'huile de coco ou de sources d'huiles naturelles similaires, telle que l'huile de palme, ou de sources de graisses animales, tel que le suif. Dans ce cas, chaque R est un mélange de radicaux alkyles contenant environ de 5 à 18 atomes de carbone. Dans un produit plus préférentiel, le mélange de radicaux alkyle dérive d'une fraction saturée d'huile de coco ou d'huile végétale naturelle similaire. Dans le cas de l'acide gras de l'huile de coco, chaque radical R varie entre environ 6 et environ 18 atomes de carbone. Les fourchettes indiquées couvrent environ 90 % des groupes R du composé. Etant donné que lesdits groupes R dérivent de sources naturelles, ils peuvent contenir de faibles quantités d'autres chaînes carbonées. Par ailleurs, on peut mettre en oeuvre des imidazolines à base d'acides carboxyliques purs, tels que, par exemple, l'acide laurique, ou d'autres coupes, en fonction de l'application particulière.

Les imidazolines mises en oeuvre selon la présente invention devraient se présenter sous une forme essentiellement pure. "Essentiellement pure", signifie exempt, dans une large mesure, d'acides gras, d'aminoéthylthéanolamine, d'amido esters et de diamides. Pour les besoins de l'invention, on peut accepter la présence d'amido amines. Tout procédé approprié de préparation des imidazolines peut être mis en oeuvre.

Comme exemples d'imidazolines de départ, on peut citer la 2-heptylimidazoline, la 2-dodécylimidazoline, la 2-heptadécylimidazoline, la 1-hydroxyéthyl-2-dodécylimidazoline, la 1-hydroxyéthyl-2-heptadécylimidazoline et autres similaires. Comme exemples d'acides gras purs ou de mélanges d'acides gras que l'on peut mettre en oeuvre pour préparer les imidazolines, on peut citer l'acide gras de l'huile de coco, l'acide de l'huile de palme, les acides gras caprique, caproïque, caprylique, hexadécadiénolique, laurique, linoléique, linolénique, margarique, myristique, myristoléique, oléique, palmitique, palmitoléique, stéarique et autres similaires.

En ce qui concerne la mise en oeuvre pratique du procédé de l'invention, on émet l'hypothèse selon laquelle, l'imidazoline réagit dans des conditions qui favorisent l'ouverture du cycle de l'imidazoline avant que n'intervienne la réaction d'alcylation. Dans les phases initiales, la réaction est généralement conduite de façon à favoriser l'ouverture du cycle. Dans l'une des réalisations de l'invention, l'imidazoline est chauffée à un pH élevé compris entre environ 8,5 et environ 10 pour faciliter l'ouverture d'au moins une majorité de cycles de l'imidazoline. Dans une autre réalisation, l'imidazoline peut être additionnée de monohalogénoacétate à un pH élevé dans des conditions favorisant l'ouverture du cycle. Dans une troisième réalisation, le monohalogénoacétate est ajouté à l'imidazoline pendant l'addition de base dans des conditions telles que le pH est maintenu dans la fourchette comprise entre environ 9 et environ 10 pendant la durée de l'addition. Cette théorie est présentée dans le but d'essayer d'expliquer l'invention, mais la demanderesse ne souhaite pas en être prisonnière.

Dans la mise en oeuvre pratique de l'invention, on chauffe l'imidazoline avec un sel de monohalogénoacétate. L'halogénoacétate se présente de préférence sous la forme d'une solution aqueuse avant d'être ajouté

à l'imidazoline. Pour ce faire, il est commode de préparer le sel à partir de l'acide juste avant la réaction. L'avantage que présente cette façon de procéder réside dans le fait que le sel peut être préparé avec un excès de base permettant de neutraliser l'acide hydrohalogéné qui se forme pendant la réaction de l'imidazoline avec le sel d'halogénoacétate. Le pH en excès varie entre environ 8 et environ 10. Il va de soi que le sel d'halogénoacétate peut être acheté et préparé ailleurs, dissous dans de l'eau et mis en oeuvre tel quel ou, de préférence, avec la quantité de base ajoutée correspondant à l'excès dont il a été question plus haut.

Comme exemples de sels de monohalogénoacétate appropriés dans lesquels la fraction cationique est un ion métal alcalin, on peut citer le monochloroacétate de sodium, le monobromoacétate de sodium, le monochloroacétate de potassium et le monobromoacétate de potassium. Les monohalogénoacétates préférés sont les sels de sodium et de potassium de l'acide monochloroacétique.

Comme exemples d'alcalis appropriés pouvant être mis en oeuvre dans le procédé de l'invention, on peut citer l'hydroxyde de sodium, l'hydroxyde de potassium, le carbonate de sodium, le carbonate de potassium, le bicarbonate de sodium, le bicarbonate de potassium et autres similaires. L'alcali est de préférence l'hydroxyde de sodium et/ou de potassium.

Le rapport molaire de l'acide monohalogénoacétique ou de sa forme sel à l'imidazoline ou à l'amine est de préférence supérieur à 1. Lorsque les quantités sont inférieures à 1, l'acide monohalogénoacétique, présent en quantité insuffisante, assure une acoylation complète, le produit étant alors contaminé par l'amido amine qui ne possède aucune activité de surface. Si l'on met en oeuvre un rapport trop élevé, le produit contiendra un excès d'acide glycolique puisque le sel de monohalogénoacétate réagit avec la base pour la transformer en acide glycolique. L'un des résultats surprenants de la présente invention réside dans le fait que le rapport peut être maintenu aussi bas que possible avec un léger excès permettant de conduire la réaction à son terme tout en obtenant une acoylation quasiment complète. Il est possible grâce à la présente invention de maintenir le rapport aussi bas que 1,05 : 1. Le rapport varie de préférence entre environ 1,05 : 1 et environ 1,5 : 1, plus préférentiellement entre 1,05 : 1 et environ 1,4 : 1 et, plus préférentiellement encore entre 1,05 et environ 1,2 : 1.

La réaction est conduite en règle générale à une température qui aboutit à la réaction comme il est bien connu dans l'industrie. Les températures de la réaction principale peuvent aller jusqu'à 95°C; elles sont comprises, de préférence, entre environ 50°C et environ 95°C. Dans l'un des modes de réalisation de l'invention, on a mis en oeuvre une température de l'ordre de 95°C. Dans un autre mode de réalisation, on a constaté que les températures comprises entre environ 70°C et environ 80°C étaient efficaces et, dans un troisième, on a mis en oeuvre une température de l'ordre de 50°C. D'une manière plus préférentielle, la température est comprise entre environ 75°C et environ 85°C. La réaction peut être chauffée dès que l'on considère que la réaction principale est terminée afin de s'assurer que la réaction est bien complète. Pendant cette phase de la réaction, les températures peuvent monter jusqu'à 100°C.

Les temps de réaction sont suffisants pour permettre la réalisation de chacune des phases désirées de la réaction et peuvent être déterminés facilement par l'homme du métier.

En règle générale, on mélange l'acide monohalogénoacétique ou son sel et l'imidazoline d'une manière aussi rapide et pratique que possible pour que ledit mélange des réactifs soit complet. Le contrôle du pH étant essentiel, les réactifs et, notamment, le base, sont ajoutés à une vitesse permettant de prévenir toute augmentation du pH au-dessus d'environ 10. On prend toutes les précautions nécessaires pour éviter des "points chauds" (hot spots) en certains endroits au cours de l'addition de la base. On procède à une addition de la base par incréments afin d'éviter toute augmentation brutale du pH.

Le contrôle soigneux du pH et de la température pendant la réaction permet d'effectuer la réaction avec une quantité moindre de sel de monohalogénoacétate de sodium et d'obtenir un produit de plus grande pureté (moins de sous-produits amide non alcoylés, acide glycolique, NaCl et sel d'halogénoacétate résiduel). Les compositions selon la présente invention sont caractérisées par des teneurs en amide non alcoylée inférieures à environ 3,5 %, de préférence inférieures à environ 2,0 % et plus préférentiellement encore inférieures à environ 0,5 % par rapport aux matières actives. Les compositions selon la présente invention sont caractérisées aussi par des teneurs en acide glycolique inférieures à environ 4,5 %, de préférence inférieures à environ 3,5 % et plus préférentiellement encore inférieures à 2,5 % d'acide glycolique par rapport aux matières actives. Les compositions selon la présente invention sont encore caractérisées par des teneurs en sel de métaux alcalins, tel que, par exemple, en chlorure de sodium, inférieures à environ 27 %, de préférence inférieures à environ 23 % et plus préférentiellement encore inférieures à 20 % par rapport aux matières actives. En raison de l'amélioration de leur pureté, les produits selon l'invention, outre qu'ils sont économiquement plus intéressants que les produits obtenus par purification des produits préparés selon le procédé de l'état de la technique, présentent des propriétés tensio-actives supérieures et une plus grande flexibilité dans les formulations.

Les amphocétates tensio-actifs selon la présente invention sont extrêmement doux et n'irritent ni les yeux ni la peau. Ils présentent aussi une augmentation de la vitesse mouillante, une diminution plus importante

TABLEAU I

Hauteur de mousse selon Ross Miles à 25°C - 0,1% de matière active -
- au temps zéro -

ECHANTILLON/pH	pH 9,8	pH 7,1
MIRANOL CM	14,3 cm	3,5 cm
EXEMPLE 1	14,7 cm	15,3 cm

Hauteur de mousse selon Ross Miles à 25°C - 0,1% de matière active -
- 300ppm d'eau dure - pH 7 -

ECHANTILLON/DUREE (mn)	au temps zéro	après 5 minutes
MIRANOL CM	2,7 cm	2,45 cm
EXEMPLE 1	15,7 cm	15,6 cm

Il résulte clairement des résultats ci-dessus que le produit de l'invention présente, que ce soit dans de l'eau dure ou dans de l'eau douce, une activité de surface supérieure. Le produit du commerce présente, au contraire, notamment dans l'eau dure, une diminution de son activité de surface. Cela signifie que le produit du commerce est contaminé par une matière non alcoylée.

EXEMPLE 2

On procède comme dans l'exemple 1 en mettant en oeuvre différents rapports molaires entre le mono-chloroacétate de sodium (SMCA) et l'imidazoline. Les résultats qui figurent dans le Tableau II ci-dessous font apparaître une diminution de la formation d'acide glycolique et l'absence d'amido amine non alcoylée.

TABLEAU II

essai	SMCA/imidazoline molaire	amidoamine alkylée (amidoamine non alkylée)	matière active (% en poids)
1	1,10	>99,9 (<0,1)	38,3
2	1,15	>99,9 (<0,1)	37,2
3	1,20	>99,9 (<0,1)	35,2
4	1,40	>99,9 (<0,1)	36,2

essai	acide glycolique % en poids / milieu tel quel (/ à la matière active)	NaCl % en poids / milieu tel quel (/ à la matière active)	imidoamine % en poids / à la matière active
1	0,70 (1,83)	6,45 (16,8)	<0,25
2	0,76 (2,04)	6,5 (17,4)	<0,25
3	0,94 (2,67)	6,8 (19,3)	<0,28
4	1,61 (4,45)	7,1 (19,6)	<0,28

EXEMPLE 3

On procède comme dans l'exemple 1 en mettant en oeuvre une addition contrôlée de NaOH afin d'obtenir un pH constant durant toute la réaction. Après avoir ajouté la coco imidazoline au monochloroacétate de sodium et chauffé pendant 2 heures à 75°C, on introduit une solution aqueuse à 50 % d'hydroxyde de sodium (92,2 g, 1,15 mole) à une vitesse suffisante pour maintenir le pH de la réaction entre 9,5 et 10. Le pH est contrôlé par un pH-mètre. La température réactionnelle est maintenue à 75°C. L'addition terminée, la réaction est maintenue à 75°C pendant encore une heure. L'analyse par chromatographie en phase gazeuse montre que le produit a une teneur en amido amine non alcoylée inférieure à 0,2 %.

EXEMPLE 4

Cet exemple est réalisé selon la présente invention en mettant en oeuvre une addition simultanée d'acide chloroacétique et d'hydroxyde de sodium. On émet l'hypothèse selon laquelle, dans ce procédé, l'imidazoline est transformée dans un premier temps en amine secondaire qui, dans un second temps, est alcoylée par la lente addition concomitante d'agent d'alcoylation et d'hydroxyde de sodium.

Dans un ballon à 5 tubulures, équipé d'un agitateur, d'un thermomètre, de deux ampoules et d'un pH-mètre, on introduit 75 g d'eau et 70 g (0,25 mole) de coco imidazoline. On porte le mélange réactionnel à une température de 80°C. On ajoute simultanément à la solution, tout en maintenant le pH entre 9 et 10, 56,7 g (0,3 mole) d'acide chloroacétique aqueux à 50 % et 40 g (0,5 mole) de solution d'hydroxyde de sodium à 50 %. L'addition est effectuée en 1 heure. Le mélange est agité pendant deux heures supplémentaires à 80°C. Le rapport du chlore est de 0,99. L'analyse par RMN indique une absence d'amido amine non alcoylée, ce qui est confirmé ultérieurement par la chromatographie en phase gazeuse.

EXEMPLE 5

Cet exemple constitue l'illustration du procédé dans lequel l'imidazoline est transformée, dans un premier temps, en amine secondaire et, dans un second temps, alcoylée par la lente addition concomitante de l'agent d'alcoylation et d'hydroxyde de sodium.

Dans un réacteur de 2 litres, équipé de deux pompes pour réactifs, d'un agitateur tournant à environ 450 t / mn, muni de pales en polytétrafluoroéthylène et d'une tige, d'un système de contrôle de la réaction utilisant un thermocouple en verre et un système de contrôle de la température, et d'un système d'aspersion d'azote à faible balayage, on introduit 380 g (1,38 mole) de coco imidazoline, 380 g d'eau et 2 g d'une solution d'hydroxyde de sodium à 47 %. On chauffe le mélange à 85°C en agitant et en procédant à une aspersion d'azote. Après avoir atteint 85°C, on porte la température à 95°C en 1 heure. Le pH est de 9,2. Dès que l'on a atteint 95°C, on commence à introduire lentement 675 g d'une solution de monochloroacétate de sodium à 25 % (1,45 mole - rapport molaire de 1,05 : 1). L'addition se déroule à raison de 2,8 g/minute (moyenne de dix réactions)

ce qui équivaut à 5 ml/minute. Au total, l'addition dure 244 minutes. Environ 1 heure après avoir démarré l'addition du monochloroacétate de sodium, on ajoute 264 g (1,65 mole - rapport molaire 1,19) d'une solution d'hydroxyde de sodium à 25 % à raison de 0,9 g/minute ce qui équivaut à 5,6 ml/minute. La durée totale de l'addition est de 293 minutes. Pendant cette addition, le pH varie entre 9,2 et 9,7. Lorsque l'addition est terminée, on chauffe le mélange réactionnel à une température comprise entre 97 et 100°C pendant 2 heures et on laisse refroidir. Le pH est neutralisé à l'aide d'acide chlorhydrique. Le rendement en produit de la réaction est de 1 683 g. Le produit analysé par chromatographie en phase gazeuse et HPLC contient 36,5 % de matières solides, moins de 0,9 % de matière non alcoylée, 0,8 % d'acide glycolique et 7,2 % de chlorure de sodium par rapport au poids de produit tel quel. Cela correspond à 26,1 % de chlorure de sodium, 2,9 % d'acide glycolique et 3,3 % de matière non alcoylée par rapport aux matières actives.

EXEMPLE 6

Dans un réacteur revêtu de verre, équipé d'un agitateur, d'un condenseur, d'une arrivée et d'une évacuation rapide d'azote, d'un chauffage à la vapeur, d'un refroidissement par eau et de deux pompes doseuses, on introduit 225 parties de coco imidazoline (poids moléculaire moyen 268), 200 parties d'eau et 2 parties d'une solution d'hydroxyde de sodium à 25 %. On chauffe le mélange à la vapeur jusqu'à ce que l'on atteigne 85°C et, ensuite, pendant 1 heure, on applique la vapeur de façon intermittente jusqu'à ce que l'on atteigne lentement une température de 95°C. Après avoir atteint cette température de 95°C, on commence à introduire lentement 445 parties d'une solution aqueuse de monochloroacétate de sodium à 25 % (rapport molaire SMCA/imidazoline de 1,2/1). La vitesse moyenne de l'addition est de 95 parties/heure. Une heure après avoir démarré l'introduction du SMCA, on commence à ajouter 150 parties d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium à 25 % (1,19 équivalents molaires). La solution d'hydroxyde de sodium est introduite par incréments à une vitesse approximative de 16 parties par heure à l'aide d'un système d'introduction modulée permettant de maintenir le pH entre 8,5 et 9,5.

La température est maintenue à 95°C pendant toute la réaction, sauf à la fin de la réaction où la température est portée à 98°C pour transformer le SMCA résiduel en acide glycolique.

Après neutralisation, l'analyse donne les résultats suivants:

- Matières solides 35,9 %
- pH (20 %) 8,42
- Color
 - . Gardner 2
 - . Lovibond 11Y - 2,2R

	% / au poids de produit tel que	% / au poids de matières actives
NaCl	7,19	26,5
Amido amine	0,86	3,2
SMCA	< 5 ppm	
Acide glycolique	0,8	2,95
Azote	2,2	

EXEMPLE 7

Cet exemple est un exemple comparatif qui montre l'effet exercé sur la présence d'espèces non alcoylées lorsque l'on ne respecte pas les conditions de l'invention. A 116,6 g (1,0 mole) de chloroacétate de sodium en solution dans 350 g d'eau, on ajoute 92,8 g (1,16 mole) d'une solution d'hydroxyde de sodium à 50 %. On ajuste la température de la réaction à 35°C et on ajoute rapidement 278 g (1,0 mole) de coco imidazoline. La température de la réaction varie entre 85 et 90°C et est maintenue à cette température pendant 3 heures. On ajuste le liquide limpide à 45 % de matières solides et on fait une analyse. L'analyse par chromatographie en phase gazeuse montre que le produit contient de l'amido amine non alcoylée. Le rapport du produit alcoylé au produit non alcoylé est de 75/25.


EXEMPLE 8

Cet exemple est un exemple comparatif qui met en oeuvre l'exemple 1 du brevet US n° 4 269 730. Ce brevet enseigne que la réaction entre l'imidazoline et le sel de chloroacétate est conduite à un pH inférieur à 9 (pH 7,5 - 8,5) afin d'obtenir une bétaine cyclique stable à des pH inférieurs à 9. Les réactions enseignées dans ce brevet sont effectuées en vue de préparer la bétaine en maintenant un pH qui n'est que légèrement alcalin.

Le procédé selon l'Exemple 1 du brevet US n° 4 269 730 est mis en oeuvre conformément aux conditions énoncées. L'analyse par chromatographie en phase gazeuse montre que le produit obtenu présente un rapport entre l'amido amine alcoylée et l'amido amine non alcoylée de l'ordre de 85/15. Une seconde expérience mettant en oeuvre un rapport molaire de 1,2 : 1 entre le mono chloroacétate de sodium et l'imidazoline donne un produit présentant un rapport du produit alcoylé au produit non alcoylé (analyse par chromatographie en phase gazeuse) de 70/30.

Revendications

1. Composition tensio-active à base d'amphoacétate dérivé de l'imidazoline substituée et contenant comme composant principal un composé de formule




dans laquelle R représente des radicaux aliphatiques contenant environ de 5 à 19 atomes de carbone, \underline{n} est un nombre entier de 2 à 4, X représente OH ou NH₂ et M est un métal, ladite composition contenant moins d'environ 3,5 % d'amide non alcoylée et moins d'environ 4,5 % d'acide glycolique.

2. Composition selon la revendication 1 dans laquelle ladite composition contient moins d'environ 2,0 % d'amide non alcoylée.
3. Composition selon la revendication 1 dans laquelle ladite composition contient moins d'environ 3,5 % d'acide glycolique.
4. Composition selon la revendication 2 dans laquelle ladite composition contient moins d'environ 3,5 % d'acide glycolique.
5. Composition selon la revendication 1 dans laquelle ladite composition contient, en outre, moins d'environ 27 % d'un sel d'halogénure de métal alcalin.
6. Composition selon la revendication 1 dans laquelle ladite composition contient, en outre, moins d'environ 23 % d'un sel d'halogénure de métal alcalin.
7. Composition selon la revendication 3 dans laquelle ladite composition contient, en outre, moins d'environ 27 % d'un sel d'halogénure de métal alcalin.
8. Composition selon la revendication 4 dans laquelle ladite composition contient, en outre, moins d'environ 23 % d'un sel d'halogénure de métal alcalin.
9. Composition selon la revendication 1 dans laquelle X représente OH.
10. Composition selon la revendication 1 dans laquelle R dérive d'un acide choisi dans le groupe comprenant les acides gras de l'huile de coco, les acides gras de l'huile de palme, les acides caprique, caproïque, caprylique, hexadécadiénoïque, laurique, linoléique, linoléique, margarique, myristique, myristoléique, oléique, palmitique, palmitoléique et stéarique et leurs mélanges.
11. Composition selon la revendication 1 dans laquelle R dérive des acides gras de l'huile de coco.
12. Composition selon la revendication 1 dans laquelle M est un métal alcalin.
13. Composition selon la revendication 1 dans laquelle R dérive des acides gras de l'huile de coco, \underline{n} est 2, X représente OH et M est le sodium.
14. Procédé de préparation d'un amphoacétate tensio-actif comprenant la réaction d'une alkylimidazoline ou

d'un de ses dérivés à cycle ouvert avec un acide monohalogénoacétique ou l'un de ses sels en présence d'un alcali dans des conditions telles que le pH du mélange réactionnel pendant la réaction ne dépasse pas un pH d'environ 10.

- 15 15. Procédé selon la revendication 14 dans lequel l'imidazoline est un composé représenté par la formule :



15 dans laquelle R est un radical aliphatique contenant de 5 à 19 atomes de carbone par molécule, X est OH ou NH_2 et $_N$ est un nombre entier allant de 2 à 4 inclus.

16. Procédé selon la revendication 15 dans lequel X représente OH.
- 20 17. Procédé selon la revendication 15 dans lequel R dérive d'un acide choisi dans le groupe comportant les acides gras de l'huile de coco, les acides gras de l'huile de palme, les acides caprique, caproïque, caprylique, hexadécadiénoïque, laurique, linoléique, linolénique, margarique, myristique, myristoléique, oléique, palmitique, palmitoléique et stéarique ainsi que leurs mélanges.
18. Procédé selon la revendication 14 dans lequel l'alkylimidazoline est la coco imidazoline.
- 25 19. Procédé selon la revendication 14 dans lequel le réactif monohalogénoacétique est le sel de sodium de l'acide monochloroacétique.
20. Procédé selon la revendication 14 dans lequel l'alcali est choisi dans le groupe comprenant l'hydroxyde de sodium, l'hydroxyde de potassium, le carbonate de sodium, le carbonate de potassium, le bicarbonate de sodium, le bicarbonate de potassium ainsi que leurs mélanges.
- 30 21. Procédé selon la revendication 14 dans lequel le pH durant la réaction est maintenu dans une fourchette comprise entre environ 8,5 et environ 9,5.
- 35 22. Procédé selon la revendication 14 dans lequel la réaction est conduite à une température comprise entre environ 75°C et environ 85°C.
23. Procédé selon la revendication 14 dans lequel le rapport de l'acide halogénoacétique ou de son sel à l'alkylimidazoline est compris entre environ 1,05:1 et environ 1,5:1.
- 40 24. Procédé selon la revendication 15 dans lequel R est un radical aliphatique contenant de 5 à 19 atomes de carbone par molécule, X représente OH et $_N$ est un nombre entier égal à 2, M est le sodium, l'alcali est l'hydroxyde de sodium et/ou de potassium et la température est comprise entre environ 50°C et environ 95°C.
- 45 25. Procédé selon la revendication 14 dans lequel la majeure partie de l'imidazoline se présente sous la forme d'un cycle ouvert lors de la réaction.
26. Procédé selon la revendication 25 dans lequel le pH durant la réaction est maintenu à une valeur comprise entre environ 8,5 et 9,5.
- 50 27. Procédé selon la revendication 25 dans lequel l'alkylimidazoline est une coco imidazoline.
28. Procédé selon la revendication 25 dans lequel le réactif monohalogénoacétique est le sel de sodium de l'acide monochloroacétique.
- 55 29. Procédé selon la revendication 25 dans lequel la quasi totalité de l'alkylimidazoline est un dérivé à cycle ouvert.

30. Procédé de préparation d'un amphoacétate tensio-actif comportant:
- a) la réaction d'une alkylimidazoline à la chaleur à un pH compris entre environ 8,5 et environ 9,5 en vue de former un dérivé à cycle ouvert de ladite alkylimidazoline,
 - b) la réaction dudit dérivé à cycle ouvert de ladite imidazoline avec un acide monohalogénoacétique ou l'un de ses sels en présence d'un alcali dans des conditions telles que le pH du mélange réactionnel durant la réaction ne dépasse pas un pH supérieur à environ 10 et
 - c) la récupération dudit amphoacétate tensio-actif.
31. Procédé de préparation d'un amphoacétate tensio-actif comportant:
- a) la réaction d'une alkylimidazoline à la chaleur à un pH compris entre environ 8,5 et environ 9,5 pendant une période de temps suffisante pour ouvrir la majeure partie des cycles de l'alkylimidazoline,
 - b) la réaction du produit de la phase a) avec un acide monohalogénoacétique ou l'un de ses sels en présence d'un alcali dans des conditions telles que le pH du mélange réactionnel durant la réaction ne dépasse pas un pH supérieur à pH 10, la température de la réaction étant comprise entre environ 50°C et environ 95°C, et
 - c) la récupération dudit amphoacétate tensio-actif.
32. Le produit du procédé selon la revendication 14.
33. Le produit du procédé selon la revendication 21.